*Was immer der Vater einer
Krankheit gewesen ist –
die Mutter war eine
schlechte Ernährung !*

-

altes chinesisches Sprichwort

Da wächst was heran:

Wachstumsfaktoren

- Licht
- Temperatur
- Wasser
- CO₂
- O₂
- Nährstoffe

Die Pflanze ist

- Funktionsträger im Ökosystem
- Nährstoffüberträger = Nahrungsmittel für Mensch und Tier
- Energieüberträger für Mensch und Tier
 - Chemisch gebundene Lichtenergie
 - aber auch im Sinne von Lebensfreude

Prozesse

- Photosynthese
- Atmung
- Eiweißsynthese
- Fettsynthese

Produkte

- Kohlenhydrate
 - Eiweiße
 - Fette
- dienen der Pflanze als
- Inhaltsstoffe
 - Baustoffe
 - Energieträger

Voraussetzungen für Bodenentwicklung

Abb. 19: Gute Krümelstruktur mit vielen feinen Pflanzenwurzeln, rüchlichen Kügelchen mit bis zu 5 mm Durchmesser, lockere Struktur und dunkel-

Abb. 20: Der gleiche Boden ohne Humus: scharfkantiger Bruch, dichte Lagerung und helle Färbung zeigen einen leblosen mineralischen Bodenkörper.

Voraussetzungen für Bodenentwicklung

- Humusaufbauende Biologie aufs Feld
- Optimale Lebensbedingungen dafür schaffen
- Diese Biologie ständig füttern/versorgen
- Die Bodenbearbeitung der Biologie anpassen
- Alle Störfaktoren möglichst ausschalten
- Pufferfähigkeit
- Basensättigung
- Optimale Bodenfeuchte
- Gute Sauerstoff-Versorgung
- Vermeidung von Fäulnis
- Optimales C/N-Verhältnis,

Individuenzahl und Biomasse der Lebewesen auf einem Quadratmeter Wiese (von der Oberfläche bis in 80 cm Tiefe)

Nicht mit bloßem Auge sichtbar:

Bakterien	10 000 000 000 000 Ind.	160 g Biom./m ²
Pilze	12 000 000 000 Ind.	380 g Biom./m ²
Algen	1 000 000 000 Ind.	90 g Biom./m ²
Einzellige Tiere	600 000 000 Ind.	115 g Biom./m ²
Fadenwürmer	1 800 000 Ind.	4 g Biom./m ²

Mit bloßem Auge sichtbar:

Springschwänze	26 000 Ind.	11 g Biom./m ²
Milben	18 000 Ind.	10 g Biom./m ²
Kleine Borstenwürmer	10 000 Ind.	2 g Biom./m ²
Käfer und Käflerlarven	800 Ind.	8 g Biom./m ²
Tausendfüßler	550 Ind.	20 g Biom./m ²
Ameisen	320 Ind.	2 g Biom./m ²
Asseln	300 Ind.	4 g Biom./m ²
Fliegenlarven	240 Ind.	26 g Biom./m ²
Spinnen	230 Ind.	2 g Biom./m ²
Regenwürmer	130 Ind.	145 g Biom./m ²
Schnecken	50 Ind.	25 g Biom./m ²

Auf 1 m² Wiese leben
Bodenorganismen mit
einem Gewicht von
1000g. Hochgerechnet
auf 1 ha sind dies 10.000
kg (20 GV).

Puffer

- In Böden sind organ. + anorganische Verbindungen, die in der Lage sind H⁺-Ionen aufzunehmen u. dr.Austausch mit basischen Kationen einen sauren Eintrag in den Boden abzuschwächen.
- Basische Kationen -> Ca, Mg, K, ihre Summe ergibt die Kationenaustauschkapazität -> KAK

Basensättigung

- Sie gibt den %-Anteil der Basischen Kationen
 - > Ca, Mg, Na, K, an der KAK an.
 - > Ca, Mg, K sollten einen Anteil von über 80 % haben

Humusentwicklung nach Hülsbergen

Humus

Ich verstehe unter „Humus“ immer die stabile organische Bodensubstanz, den Dauerhumus, ->er wird durch die Mikrobiologie durch Ab-, Um- und Aufbauprozesse hergestellt und ist stabil

Humus

- Besteht zu 58% aus Kohlenstoff
- Bindet CO₂ -> Klimaschutzeffekt
- Besteht zu 6% aus Stickstoff
- In 1 % Humus, bezogen auf 30 cm Bodentiefe, sind 2.000 – 2.500 kg N gebunden
- Zum Humusaufbau bedarf es N
- Je mehr N organisch im Humus gebunden ist, je weniger kann verloren gehen.

Die 2 Paar Schuhe des C/N-Verhältnisses als Meßgröße

1. C/N-Verhältnis als Maßstab für die Zersetzbarkeit organischer Substanz
 - 1 – 20 -> enges C/N-Verhältnis
 - > schnelle NS-Verfügbarkeit
 - 21 – 35 ->mittlers C/N-Verhältnis
 - > geeignet für Humusaufbau
 - Größer 35 -> weites C/N-Verhältnis
 - > N-Fixierung

Die 2 Paar Schuhe des C/N-Verhältnisses als Meßgröße

2. C/N-Verhältnis zur Beurteilung von Bodenfruchtbarkeit

- Liegt bei 9 – 11
- C/N von 10/1 -> es ist im Vergleich zu N 10 mal mehr C im Boden gebunden
- Böden mit C/N von 9 -> setzen N frei
- Böden mit C/N von 11 -> binden, fixieren N

Humusaufbau

- Um 1 % Humus -> 30 cm Bodentiefe, aufzubauen, werden
25 t/ha C und 2,5 t N/ha benötigt

-> das ist die Herausforderung
der Bio-Landwirtschaft

Stickstoff-Nachlieferung aus Humus

- Erfolgt nur bei C/N-Verhältnissen kleiner 10
- Pro % Humus können 25 kg N/ha freigesetzt werden
- Bei 4 % Humus im Boden
und einem C/N von 8-9 werden
ca. 100 kg N/ha frei
- Bei 4% Humus, C/N 11 werden 100kg N/ha fix

Messen des C/N-Verhältnisses

- Es werden die Bodenfraktionen C-org. und der Gesamt-N-Gehalt gemessen und ins Verhältnis gesetzt.
- Über dieses Analyse-Verfahren kann der N-Bedarf zur Erhöhung des Humusgehaltes z.B. um 1 % ausgerechnet werden
- Es kann auch der optimal anzustrebende Humusgehalt des vorliegenden Bodens abgeleitet werden
- Labore -> Ökodatenservice GmbH, AT
-> BOWASAN, AT

Wie steigern ich die Nährstoff-Nachlieferung meiner Böden?

- Den Humusgehalt ins Optimum bringen
 - > je nach Bodenart und Klima -> 4 -7 %
 - > 100 – 350 kg/ha N-(Nach)-Lieferung
- Organisch-mineralisch Düngerezufuhr breit
 - >Mengenbegrenzung durch Richtlinien
- N-Freisetzungen durch Priming-Effekte
 - > Ertragshacke, EM,
 - > Achtung Humusverlust !!!!!!!!!!!!!
- **Cultan-Düngungsverfahren**
 - > **auch mengenbegrenzt, aber höhere Nährstoffeffizienz**

Depot-Dünge-Verfahren bieten Lösungsansätze für biologische Anbauverfahren

Die intensive Auseinandersetzung mit dem CULTAN – Verfahren haben den Verfasser dazu bewogen, die dies bezüglichlichen Erkenntnisse auf biologische Anbauverfahren im Rahmen ihrer Richtlinien zu übertragen und biologisch zugelassene Stickstoff-Düngemittel als Depot-Dünger anzuwenden. Besonders für Bio – Zierpflanzen, Gemüse- und Marktfruchtbaubetriebe.

Unternehmen mit hohen Nährstoffabfuhr ohne eigene Tierhaltung ist eine Optimierung der Nährstoffeffizienz bei optimaler Klimaschutzung sinnvoll.

Das folgende Versuchsergebnis und Erfahrungen im Bio-Zierpflanzenanbau ermutigen zur Weiterentwicklung der Depot- und Punkt-Düngung für den Biologischen Landbau.

Dieses Düngeverfahren wird in Zukunft die Bezeichnung **BORN** – Biological Organic Regulated N-utrition - tragen.

C ontrolled	Kontrollierte N-Aufnahme durch langfristige NH₄-Ernährung
U ptake	
L ong	
T erm	
A mmonium	
N utrition	

Der Stickstoffkreislauf:

Humus aufbauender Pflanzenbau mit CULTAN

Techniken für das CULTAN - Verfahren

Injektionsmasch.
flüssig

Schleppschl.
flüssig

Mulchsaatmasch.
fest

Winterweizen –CULTAN – Versuch bei Landwirt Kühnen 2009

Säen und Düngen aller Getreidearten in einer Überfahrt

www.eco-dyn.de

Was ist anders bei einer N-Aufnahme in Form von Ammonium in die Pflanze

- Es entwickeln sich wurzeldominante Pflanzen, aufgrund von Verschiebungen im Auxin/Gibberilin zu Kinitin – Verhältnis
- Die Protein-Biosynthese findet in der Wurzel, nicht im Blattapparat statt
- Aufgrund des Münch-Gegenstrom-Prinzips wird die Nährstoffversorgung der Pflanze durch die vorhandenen Wachstumsbedingungen gesteuert
- Es findet keine „Nährstoffüberflutung“ wie bei einer Nitraternährung statt

**Wurzelentwicklung in
Abhängigkeit von der
Zusammensetzung
der NH_4 -Depots**

Was ist anders bei einer N-Aufnahme in Form von Ammonium in die Pflanze

- Ammonium ernährten Pflanzen steht mehr Energie als NO_3 ernährten Pfl. zur Verfügung, weil der Einbau von NH_4 in Eiweiß - Verbindungen weniger energieaufwendig ist als der Einbau von NO_3 . Es sind weniger Reaktionsschritte nötig.
- die freie Energie nutzt die Pflanze zum Aufbau von Trockenmasse -> stabilere Zellwände fördern Krankheitsabwehr, Lagerfähigkeit u. Haltbarkeit, Qualität und Geschmack

Blattentwicklung bei Winterweizen in Abhängigkeit von der N-Düngung

Fahnenblätter der Sorte Flair

135 kg N als KAS

- 1. Gabe: 12.03.99, ES 12
- 2. Gabe: 27.04.99, ES 30
- 3. Gabe: 25.05.99, ES 39

130 kg N als AHL (Cultan)
am 30.04.99, ES 30

Ammonium-Ernährung

Nitrat-Ernährung

FIG. 1. Photomount showing the glaucousness of kohlrabi leaves: A, Pieces of kohlrabi leaves showing the distinct and conspicuous glaucousness of ammonium (top right) relative to nitrate-fed leaves (left bottom) (vertical view). **B.** Micrograph of the epicuticular wax on the adaxial surface of a glaucous, ammonium-fed kohlrabi leaf showing a dense network of dendrites, 0.8–1.8 μm wide and 2.5–3 μm long, superimposed on small tubes and plates, embedded within an underlying layer of amorphous wax. Height of the micrograph represents 15.6 μm . Magnification $\times 5000$. **C.** Micrograph of the epicuticular wax on a shiny, non-glaucous, nitrate-fed adaxial leaf showing erect, separate, crystalline wax tubes and plates. Height of the micrograph represents 15.6 μm . Magnification $\times 5000$.

Blattoberflächen in Abhängigkeit von der N-Düngung

Wann kommt es zu pH – Wert – Veränderungen ?

- bei intensivem Pflanzenbau im gewachsenen Boden mit intensiver Bodenbearbeitung findet die Stickstoffernährung aufgrund der Mineralisation immer in Nitratform statt.
- dadurch kommt es zu pH-Wert Senkungen, Ca-Auswaschungen -> es bildet sich $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, und zu Strukturverlusten
- Bei BORN- gedüngten Pflanzen ist die pH-Wert- Absenkung durch die Verhinderung der Nitrifikation minimal.

pH-Wert in Abhängigkeit vom N-Angebot

Tab.: 1 Wirkungsgrad des Stickstoffs i.v.H bei N-Kopfdüngung und „CULTAN“-Verfahren

Art der N-Düngung	Kopfdüngung	„CULTAN“-Verfahren
Langfristiger Wirkungsgrad der N-Düngung	60 - 70	90 - 100
Direkter Wirkungsgrad der N-Düngung	35 - 45	90 - 95
N aus der Mineralisation vom Boden	65 - 55	25 - 10

Welche Dünger sind CULTAN - geeignet?

- Reine Ammonium- Depots sind gegenüber Mischdepots aus NH_4 , Harnstoff u. NO_3 hinsichtlich Ertrags- u. Qualitätssicherheit, Pflanzengesundheit u. Wassereffizienz, insbesondere bei Körnerfrüchten überlegen.
- Aus logistischen Überlegungen, insb. höhere Nährstoffgehalte u. rationellere Arbeitserledigung werden der Praxis Ammonium- Depot-Mischdünger angeboten.
- N- Dünger die neben Ammonium hohe Mengen an Harnstoff u. Nitrat enthalten, sind als CULTAN- Dünger sehr kritisch zu betrachten, vor allem zu Getreide und anderen Körnerfrüchten wie Mais, Raps oder Grassamen
- Die HAS- Lösung ist allerdings zu Gemüse und Kartoffeln als CULTAN- Dünger einsetzbar.

CULTAN-Dünger-Überblick

ASL
8 % N

100% NH₄
8 % NH₄-N

AHL
30 % N

50 % Harnstoff
15 % Harnstoff-N

25 % Nitrat
7,5 % Nitrat-N

25 % NH₄
7,5 % NH₄-N

HAS
20 % N

75 % Harnstoff
14 % Harnstoff-N

25 % NH₄
6, % NH₄-N

ASL plus
15 % N

33 % Harnstoff
5 % Harnstoff-N

10 % Nitrat
1,5 % Nitrat-N

57 % NH₄
9,5 % NH₄-N

Nitrofert
15 % N

37 % Nitrat
5,5 % Nitrat-N

63 % NH₄
9,5 % NH₄

Was sollte man zum Einsatz von Misch- Depot- CULTAN- Düngern wissen?

- Ein Mischdepot aus Harnstoff, Nitrat u. Ammonium ist auf Grund von hoher Konzentration u. der bakteriziden Wirkung von Ammonium in den Depots weitgehend stabil.
- bei normaler Witterung bleibt das auch so
- Bei feuchter Witterung diffundieren Harnstoff und Nitrat aus den Depots heraus weil sie über den Transpirationsstrom in die Pflanzen aufgenommen werden, während Ammonium auf Grund seiner Sorption im Depot verbleibt.
- Harnstoff u. Nitrat werden zuerst aufgenommen -> die Pflanzen bleiben Spross dominant -> kein CULTAN- Effekt
- Harnstoff muss im Spross hydrolysiert und in NH_2 umgewandelt werden. Bei hohen Harnstoffkonz. verbleiben der Pflanze nur begrenzt Kohlenhydrate um sie zur Wurzel für die Ammonium- Aufnahme zu transportieren

Was sollte man zum Einsatz von Misch- Depot- CULTAN- Düngern wissen?

- Nitrat wird im Spross entsprechend der Auslastung des Eiweiß- Stoffwechsels im Spross der Pflanze umgewandelt zu NH_2
- Bei der Nitrataufnahme liegt das Niveau der Eiweißbildung deutlich unter dem der Ammonium-Aufnahme
- Auch hier tritt gegenüber der Ammonium- Ernährung eine Spross dominante Wachstumsphase auf, aber nicht so ausgeprägt wie beim Harnstoff
- Aufgrund der Anreicherung von Nitrat in den Pflanzen kommt seine Wirkung als Osmoregulator zum Tragen - > weiches, wässriges Gewebe -> hohe Krankheitsanfälligkeit -> Ertragseinbußen

Gülle zum CULTAN-Dünger aufwerten

- aufkonzentrieren auf $10 \text{ kg/m}^3 \text{ NH}_4\text{-N}$
- z.B. $15 \text{ m}^3/\text{ha} \rightarrow 150 \text{ kg N/ha}$

- Aufwertung einer Rindergülle mit $4,5 \text{ kg NH}_4\text{-N/m}^3$
 - mit ASL, 8 % N, spez. Gew. 1,2 $\rightarrow 51 \text{ l ASL auf } 1\text{m}^3 \text{ R-Gülle}$
 - mit AHL, 30 % N, spe. Gew. 1,28 $\rightarrow 14,3 \text{ l AHL auf } 1 \text{ m}^3 \text{ R-Gülle}$

- Aufwertung einer Schweinegülle mit $6 \text{ kg NH}_4\text{-N/m}^3$
 - mit ASL, 8 % N, spez. Gew. 1,2 $\rightarrow 41,7 \text{ l ASL auf } 1\text{m}^3 \text{ S-Gülle}$
 - mit AHL, 30 % N, spe. Gew. 1,28 $\rightarrow 10,4 \text{ l AHL auf } 1 \text{ m}^3 \text{ S-Gülle}$

- Für den Einsatz auf leichten Böden der Gülle Piadin zusetzen
- Aufwertung findet auf dem Gülleausbringer oder Transportfass statt

Gülledepot – Wie sieht das aus ?

- 15 m³/ha Gülleagabe mit 10 kg NH₄/m³ -> 150 kg N/ha
angewendet in verschiedenen Situationen:

Schlitzabstand		Durchmesser Gülledepot	Liter Gülle je lfm
23 cm	Getr./Raps/Grünl.	2,2 cm	0,35 l
37,5 cm	Rüben/ Mais	2,7 cm	0,562 l
75 cm	Kart./ Mais	6,8 cm	1,125 l

Je nach Bodenart, Bodenfeuchte, Konsistenz der Gülle, Schlitzwerkzeuges, ...
diffundiert die CULTAN-Gülle in die Umgebung des Ablagepunktes !!!

Ammoniumemissionen bei 15 Grad Lufttemperatur

In Gramm pro m3 ausgebrachter Gulle

CULTAN-Gülle schlitzen- 2010

Landwirt-Zang-Spessart-Weizen

Schlag	Anwendung	Ertrag dt/ha	Eiweiß %	N-Düng kg N/ha	N-Entzug kg N/ha	Bilanz +/-kg
Obst hole	Konv.	90,5	12,4	60-79-40-11-12 202	180	+ 22
Alte Bäch	C-GS-1xHS fl.	95,0	13,2	185 + 11 196	201	- 5
Dörner 5	C-GS-2xHS fl.	88,0	12,8	148-11-12 171	180	+ 9
Lercheng.	C-GS-2xHS fl.	94,6	12,9	185-11-12 208	195	+ 13
Krautsch	C-GS-KAS-2xHSfl.	85,0	13,0	148-40-11-12 211	177	+ 34

CULTAN-Gülle schlitzen- 2010

Landwirt-Zang-Spessart- Roggen

Schlag	Anwendung	Ertrag dt/ha	Eiweiß %	N-Düng kg N/ha	N-Entzug kg N/ha	Bilanz +/-kg
Habicht 1	Konv.	64,8	9,9	72 – 48 120	103	+ 13
Hof 4	C-GS	73,5	9,9	138	117	+ 21
Hof 3	C-GS	71,9	9,9	150	114	+ 36

Grünland, CULTAN – Gülle geschlitzt

CULTAN – Gülle – Grünland Landwirt Baasch 2010

	1.Schnitt dt/ha TS	% TS	NEL	MJNEL/ha	2. Schnitt dt/ha TS	% TS	1.+2.Schn dt/ha TS
V 1 betr.-üblich	54,5	25	5,9	32,2	27	27,3	81,5
V 2 CULTAN-Gül.+ Piadin	54,9	24,3	5,9	32,4	23	28,6	77,9
V 3 CULT-Gül.+ Piad.+Bent.	61,2	25,6	6,1	37,3	22	29,4	83,5
V 4 Nullvariante	37	25	6,1	22,6	16	29,4	53

BORN – Depot-Applikation

Versuchsbestand am 30.07.11

...und die Erträge ...

	g/Kopf	dt/ ha FM	% TS	dt/ ha TM
V 0 Ohne Düngung	378	503	5,29%	26,61
V 1 betriebsüblich-Konv.	451	600	4,37%	26,22
V 2 AMN-BORN-M	414	551	5,09%	28,05
V 3 AMN-BORN-V	460	612	5,47%	33,47
V 4 Schafwolle	422	561	6,07%	34,05
V 5 AMN-BORN-C	412	548	5,05%	27,67
V 6 Cuxin + Heu	432	575	5,12%	29,44
V 7 nur Heu	378	503	5,45%	27,4

CULTAN - ein ganzheitliches Düngesysteme

- **Es ist ein Punkt oder Linien Düngeverfahren bei dem für jede Pflanze, ob Blume, Salat, Baum oder Strauch ein Düngerdepot in Wurzelnähe angelegt wird.**
- **Dazu werden mineralische oder organische Dünger, mit Stickstoffgehalten über 6 %, , wie z.B. ASL, ASL plus, AMN-BORN-Granulat M mit 7 % Stickstoff, 3 % Phosphor und 7 % Kali oder AMN-BORN-Granulat V mit 8 % Stickstoff, 2 % Phosphor und 7 % Kali u. 2 % Mgo verwendet**
-> Ammonium-Ernährung
- **Mit Topfmaschinen-Düngedosierer, Reihendüngergerät, bei Kübelpflanzen oder kleinen Beständen mit Akkuschauber, legt man 3 – 4 cm neben der Pflanze, je nach Saat bzw. Pflanztiefe, 6 – 8 cm tief, über ein Dosierorgan , bei Einzelpflanzen mit Messbecher, die optimale Düngermenge ab.**

CULTAN - ein ganzheitliches Düngesysteme

- **Das Dünger- Depot so tief ablegen, dass es nicht bei Pflege-, Jäte- oder Hackarbeiten zerstört wird.**
- **Bei Bäumen und Sträuchern Reihendüngeegerät, Erdbohrer, Akkuschauber oder Spaten verwenden ,um ein Depot in ca. 20 – 40 cm Tiefe, je nach Boden- und Wurzelraumbeschaffenheit anzulegen.**

CULTAN - ein ganzheitliches Düngesysteme

➤ Pflanzenschutzeffekte

- durch die Punktdüngung eine opt. Nährstoff - Versorgung nur für die Kulturpflanzen:
Begleitpflanzen, Unkräuter erreichen das Depot nicht u. entwickeln sich nur schwach
- weniger sekundäre Pilzbefall
- verring. Trauermückenprobleme

➤ ermöglicht Mulchsysteme

- Düngung erfolgt unterhalb der Mulchschicht
- N-Fixierungsmileu in MS schränkt Unkrautwachstum ein
- Hohe Bodenleben Aktivität in MS reguliert Krankheitsdruck
- MS ohne breit verteilte Düngung schaffen weite C/N-Verhältnisse von $> 25 : 1$ und damit die Voraussetzung zur Bildung von Dauerhumusformen

erfolgreiche Humuswirtschaft mit CULTAN !!!

- Stroh, optimal auf der Fläche verteilt, belassen, ohne N – Ausgleich
- Umstellung auf pfluglose Bodenbearbeitung
- Keine breitflächige Ausbringung von N – Düngern
- Gülle ein schlitzen
- Keine Gründüngung in den Boden einarbeiten
nur bei N – Mangel ist es möglich, die Bodenbakterien als Konkurrenten der Regenwürmer um biologisch wertvolle Anteile verfügbarer Nahrung zurückzudrängen
- Ziel ist optimaler Weise die Produktion im N - Fixierungsmilieu

Produktion im N - Fixierungsmilieu

- den Pflanzen stehen im Boden nur geringe Mengen an mineralisierten Stickstoff zur Verfügung
- bei Aussaat und Pflanzung sind Startgaben in Ammoniumform erforderlich, PPF-System Horsch zu Getreide, UF-Düngung zu Reihenkulturen, ...
- die Depot-Ablage, punkt- oder linienförmig, erfolgt unterhalb der Mulchschicht im Boden
- hohe Bodenaktivität reduziert Krankheitserreger
- das N-Fixierungsmilieu schränkt das Unkrautwachstum ein